

כלי דם

- (1) דליות Varices cruris
- א. ורידים בולטים על הגפיים התחתונות ללא סיבוכים והפרעות 1%
- ב. ורידים בולטים על הגפיים התחתונות, חד או דו-צדדי, עם התכווצויות וכאבים 10%
- ג. ורידים בולטים על הגפיים התחתונות חד או דו-צדדי, ישנם סימני Eczema וצלקות לאחר כיבים שנתרפאו 20%
- ד. ורידים המשתרעים על חלק גדול של גפה תחתונה אחת, ישנה נטיה מתמדת לדלקת עור וליצירת כיבים (צורה קשה של Eczema cruris) או (Ulcus varicosum), ללא הפרעות במחזור הורידי העמוק 30%
- ה. המצב כמתואר בסעיף קטן (1)(ד) בשתי הרגליים 40%
- ו. ורידים בולטים על הגפיים התחתונות, חד או דו-צדדי, קיימות הפרעות קשות במחזור הדם הורידי העמוק עם כיבים גדולים ועמוקים ופיגמנטציות על שטח נרחב 50%
- (2) מצב לאחר נזק בכלי-הדם הפריפריים כגון Phlebitis או Thrombophlebitis או נזק בורידיים
- א. קיימת תפיחות קלה, קבועה שאינה גדלה עקב עמידה או הליכה; ישנן הפרעות בלתי ניכרות ברגל אחת 1%
- ב. המצב כמתואר בסעיף קטן (2)(א) - בשתי הרגליים 10%
- ג. קיימת תפיחות קבועה ניכרת עקב עמידה או הליכה, ישנם Pigmentatio וכחלון ברגל אחת 20%
- ד. המצב כמתואר בסעיף קטן (2)(ג) בשתי הרגליים 30%
- ה. קיימת תפיחות קבועה, קשה שאינה יורדת בזמן המנוחה; ישנם כחלון Eczema או כיבים ברגל אחת 30%
- ו. המצב כמתואר בסעיף קטן (2)(ה) בשתי הרגליים 40%
- ז. בשתי הרגליים, בצורה קשה מאד 50%
- (3) מפרצת - Aneurysma
- א. של עורק קטן, בלי הפרעות 10%
- ב. של עורק קטן עם הפרעות קלות 20%
- ג. של עורק קטן עם הפרעות קשות 30%
- ד. של עורק גדול בגפיים העליונות עם הפרעות במחזור הדם 40%
- ה. של עורק גדול בגפיים התחתונות עם הפרעות קלות במחזור הדם 50%
- ו. של עורק גדול בגפיים התחתונות עם הפרעות קשות במחזור הדם 60%
- ז. של אב העורקים, בבית החזה או בבטן, ללא הפרעות קשות או מצב אחרי ניתוח של Aneurysma כנ"ל 60%
- ח. של אב העורקים, בבית החזה או בבטן עם הפרעות קשות 100%

Arterio - Venous Fistula (4)

אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן (3).

m. Raynaud* Endarteritis obliterans (m.Buerger) (5)

א. בצורה קלה ברגל אחת 20%

ב. בצורה קלה בשתי הרגליים 30%

ג. בצורה בינונית ברגל אחת 40%

ד. בצורה בינונית בשתי הרגליים 50%

ה. בצורה קשה 60%

ו. בצורה קשה מאד 100%

(6) נזקי כפור ברגליים

א. קיימים סימנים קלים בלבד - בועות כפור (Chillblains) 1%

ב. קיימת תפיחות מתמדת בצורה בינונית, כאבים, אודם וכד':

א. בגף אחד 5%

א. בשני הגפיים 10%

ג. עם איבוד אצבעות הרגליים או חלקים מהן, ייקבעו אחוזי הנכות לקטיעות האצבעות.